



ACİL TIP KLİNİĞİ ALT VE ÜST EKSTREMİTE TRAVMALARI ALGORİTMASI

ALT VE ÜST EKSTREMİTE TRAVMALARI

Hastanın ilk değerlendirmesi yapılır, öncelikle aktif bir kanamanın varlığı, dolaşım bozukluğu, nabız varlığı ya da öncelikli başka yaralanmanın olup olmadığına bakılır.

Eklem rotasyonu , his / motor kayıp olup olmadığına bakılır.
Damar yolu açılır, ezilme tarzı yaralanmalarda sıvı replasmanı başlanır, laboratuvar tetkikleri istenir.

Hemodinamiyi bozan ekstremitte travması varlığında hasta ameliyathane şartlarında değerlendirilir.

İki Yönlü direkt grafileri çektilir.

Ortopedi ve /veya plastik cerrahi konsültasyonu istenir.

Konsültasyon istenen doktorun istemi üzerine ileri görüntüleme tetkikleri örn. BT, MR istenir ve ağrı kesici yapılabilir.

İskemi süresi 6 saati geçmediği durumlarda: gerekli altyapı ve uzmanın bulunması durumunda , kopan uzuvun replantasyonu yapılır.
Gerekli donanım ve uzman yoksa ampute uzuv soğuk zincire uygun olarak (ringer yada NaCl ile nemlendirilmiş gazlı beze sarılarak bir plastik torbaya konulur ve ağzı sıkıca kapatılarak, su ve buz karışımı olan başka bir torbanın içine konularak) mikro cerrahi ve el cerrahisi merkezine transfer edilir.